



WARNZEICHEN BEI NEUGEBORENEN

911

Rufen Sie den Notruf (911),

falls bei Ihrem Baby Folgendes auftritt:

- keine Atmung
- keine Reaktionen
- Krampfanfall

**VERTRAUEN
SIE IHREM
GEFÜHL**



Gehen Sie in die Notaufnahme,

falls bei Ihrem Baby Folgendes auftritt:

- Probleme beim Atmen
- plötzliche Veränderung der Hautfarbe
- grünes Erbrochenes



Rufen Sie den/die Arzt/Ärztin

Ihres Babys an, falls bei Ihrem Baby Folgendes auftritt:

- Temperatur unter 36,5 °C (97,7 °F) oder über 38 °C (100,4 °F)
- Trinkschwäche
- Veränderung der nassen oder vollen Windeln
- Anzeichen einer Krankheit oder Infektion
- gelbe Augen oder Haut
- häufigeres Weinen als gewöhnlich

Diese Warnzeichen bei Neugeborenen können ohne medizinische Versorgung lebensbedrohlich werden.

- **Wenn Ihr Baby nicht atmet**, beginnen Sie sofort mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung.
- **Ein Baby, das keine Reaktionen zeigt**, ist schlaff wie eine Puppe und kann nicht aufwachen.
- **Krampfanfälle** sind ungewöhnliche rhythmische Bewegungen, die Sie nicht stoppen können.
- **Ihr Baby hat** in folgenden Situationen **möglicherweise Probleme beim Atmen**:
 - Es tritt eine Atempause auf, die Ihnen Sorge bereitet.
 - Es atmet schnell (mehr als 60 Atemzüge pro Minute).
 - Es macht beim Atmen Geräusche (Keuchen oder Pfeifen).
 - Es saugt bei jedem Atemzug unter oder zwischen den Rippen den Bauch ein und/oder Saugen im Halsbereich.
- **Eine plötzliche Veränderung der Hautfarbe** heißt, dass Ihr Baby blau, grau oder blass aussehen kann, besonders im Bereich von Mund/Lippen/Zunge.
- **Grünes Erbrochenes** kann ein Anzeichen für einen chirurgischen Notfall sein.
- **Wenn Ihr Baby eine niedrige oder erhöhte Temperatur hat**, sagt Ihr/Ihre Arzt/Ärztin Ihnen, was als Nächstes zu tun ist.
- **Anzeichen für eine Trinkschwäche bei Ihrem Baby** umfassen:
 - ungewöhnliches Erbrechen
 - weniger als 8 Mal füttern in 24 Stunden
 - regelmäßiges Aufwecken zum Füttern erforderlich
 - mehrmaliges Abweisen von Füttern
 - Unfähigkeit, gut zu saugen und zu schlucken
 - kürzeres Füttern oder weniger als gewöhnlich aus einer Flasche trinken
- **Veränderung der nassen oder vollen Windeln** bedeutet:
 - weniger nasse Windeln pro Tag
 - Bauch scheint runder und härter als gewöhnlich
 - Blut in der Windel
- **Anzeichen einer Krankheit oder Infektion** können Rötungen oder Ausfluss aus der Nabelschnur, Blutung oder Ausfluss aus der Stelle der Beschneidung, Husten sowie eine laufende oder verstopfte Nase umfassen.
- **Gelbe Augen oder Haut** sind Anzeichen von Gelbsucht und sollten von einem/einer Arzt/Ärztin beurteilt werden.
- **Häufigeres Weinen als gewöhnlich** bedeutet, dass Ihr Baby übermäßig quengelt und schwer zu trösten ist.

Name/Telefonnummer des/der Arztes/Ärztin:

Nächstgelegenes Kinderkrankenhaus:

Jedes Baby ist anders. Vertrauen Sie Ihrem Wissen über Ihr Baby und rufen Sie den/die Arzt/Ärztin Ihres Babys an, wenn Sie Anzeichen bemerken, die Ihnen Sorgen bereiten.