



신생아 경고 징후

911

신생아에게 다음의 징후가 나타나면
911에 전화하십시오.

- 호흡을 하지 않는 경우
- 반응이 없는 경우
- 경련을 일으키는 경우

여러분의
본능을
믿으십시오



신생아에게 다음의 징후가 나타나면
**응급실 또는 응급 진료소를
방문하십시오.**

- 호흡 곤란
- 피부색이 갑자기 변하는 경우
- 초록색 토사물을 토해내는 경우



다음의 징후가 나타나면 신생아의
**담당 의료진에게
전화하십시오.**

- 체온이 97.7°F (36.5°C) 미만이거나 100.4°F (38 °C) 이상인 경우
- 잘 먹지 않는 경우
- 젖거나 더러워진 기저귀에 변화가 있는 경우
- 질병이나 감염의 징후가 보이는 경우
- 눈이나 피부가 노랗게 변한 경우
- 평소보다 더 많이 우는 경우

이러한 신생아의 경고 징후는 의료적 처치를 받지 않으면 생명을 위협할 수 있습니다.

- **아기가 숨을 쉬지 않는 경우**, 즉시 심폐소생술(CPR)을 시작하십시오.
- **반응이 없는 아기는** 형겅 인형처럼 축 늘어져 있으며 깨울 수 없습니다.
- **발작**은 멈추도록 할 수 없으며 비정상적인 리듬의 움직임입니다.
- 다음과 같은 경우 **아기가 호흡 곤란을 겪을 수 있습니다.**
 - 격정될 만큼 호흡이 일시적으로 멈추는 현상이 있는 경우
 - 호흡이 빠른 경우 (분당 60회 이상)
 - 호흡 시 소리가 나는 경우 (쌽쌽거리는 소리나 휘파람 소리)
 - 호흡할 때마다 갈비뼈 아래나 사이, 그리고/또는 목 부위가 움푹 들어가는 경우
- **갑작스러운 피부색 변화**는 특히 아기의 입안, 입술, 혀 주변이 파랗거나, 회색을 띠거나, 창백해질 수 있음을 의미합니다.
- **초록색 토사물**은 응급 수술이 필요한 징후일 수 있습니다.
- **아기의 체온이 낮거나 높을 경우**, 담당 의료진이 다음 조치를 안내해 줄 것입니다.
- **아기가 잘 먹지 않는 징후**는 다음과 같습니다:
 - 비정상적인 구토
 - 24시간 동안 수유 횟수가 8회 미만인 경우
 - 수유할 때마다 깨워야 하는 경우
 - 수유를 여러 번 거부하는 경우
 - 빨고 삼키는 데 어려움을 겪는 경우
 - 수유 시간이 평소보다 짧아지거나 젖병으로 먹는 양이 평소보다 적은 경우
- **기저귀 젖을 또는 더러워짐의 변화**는 다음과 같은 의미를 가집니다.
 - 하루에 젖은 기저귀의 수가 줄어든 경우
 - 배가 평소보다 더 둥글고 단단해 보이는 경우
 - 기저귀에 피가 묻어 있는 경우
- **질병이나 감염의 징후**로는 배꼽 주변의 발적이나 분비물, 포경 수술 부위의 출혈이나 분비물, 기침, 콧물 또는 코막힘 등이 있습니다.
- **눈이나 피부가 노랗게 변하는 현상**은 황달의 징후로, 의료진의 진찰을 받아야 합니다.
- **평소보다 더 많이 우는 것**은 아기가 지나치게 보채고 달래기 어렵다는 것을 의미합니다.

담당 의료진 이름/번호:

가장 가까운 소아 병원:

모든 아기의 상황은 다릅니다. 아기에 대한 본인의 판단을 믿고,
걱정되는 징후가 보이면 담당 의료진에게 연락하십시오.